



แบบประเมินผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย

หอผู้ป่วยต้นทาง..... สถานที่ปลายทาง

วัตถุประสงค์การเคลื่อนย้าย

1. ย้ายไปหอผู้ป่วยอื่น 2. Investigation 3. Refer ไปรพ.อื่น 4. อื่นๆ.....

คาดการณ์ระยะเวลารวมในการเคลื่อนย้าย(รวมถึงกลับมายังหอผู้ป่วยเดิมในกรณีส่งตรวจ Investigation)

1. ไม่เกิน 30 นาที 2. 0.5-1 ชั่วโมง 3. มากกว่า 1 ชั่วโมง

ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย

การหายใจ 1. Room air 2. O₂ cannula 3. O₂ mask 4. ET tube

อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยมี 1. NG/OG tube 2. IV fluid 3. ICD 4. Foley's catheter 5. สาย Drain 6. อื่นๆ.....

การประเมินผู้ป่วยก่อนเคลื่อนย้าย

การประเมิน	ความเสี่ยงน้อย	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงมาก
	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน
1. SpO ₂	>95%	91-95%	≤90%
2. BP (มม.ปรอท) กรณีใช้ dopamine >5-10mcg/kg./min = 2 คะแนน กรณีใช้ dopamine >10mcg/kg./min = 3 คะแนน กรณีใช้ norepinephrine 0.2-0.5mg./kg./min = 2 คะแนน กรณีใช้ norepinephrine >0.5 mg./kg./min = 3 คะแนน	S: ≥ 100-170 D: > 60-109	S: 90-99 หรือ > 170-190 D: 60 หรือ ≥ 110-119	S: < 90 หรือ > 190 D: < 60 หรือ ≥ 120
3. HR (ครั้งต่อนาที)	> 60-110	51-60 หรือ 110-120	< 50 หรือ > 120
4. RR (ครั้งต่อนาที)	12-24	25-30	> 30 หรือ < 10
5. ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการหายใจล้มเหลว เช่น ชัก ซึม มากไม่รู้สีกตัว ไอเป็นเลือดปริมาณมาก มี stridor มีการใช้ กล้ามเนื้อหายใจ	ไม่มี	มีเล็กน้อย	มีชัดเจน
6. on ET/TT tube ใช้ Mechanical ventilator		FiO ₂ <0.6 หรือ PEEP < 6	FiO ₂ >0.6 หรือ PEEP > 6
รวมคะแนน			
แนวทางการเคลื่อนย้าย**	5 คะแนน เคลื่อนย้ายได้ทุกที่	6-10 คะแนน เคลื่อนย้ายโดย ใช้ fast track (lock lift)	11-15 คะแนน เคลื่อนย้าย โดยใช้ fast track (lock lift)
บุคคลที่ต้องไปกับผู้ป่วยและร่วมประเมิน	ไม่จำเป็น/Extern	พชท. 1	พชท. 2 ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ต้องติดตามไปด้วย	Monitor เดิม (ถ้ามี)	Monitor O ₂ sat	Monitor EKG , BP, O ₂ sat

การตรวจสอบซ้ำก่อนเคลื่อนย้าย

1. Airway protection ซึม / ไม่รู้สีกตัว ได้ protect airway แล้ว รู้ตัวดี ไม่ต้อง protect airway
2. ICD มีและตรวจสอบความพร้อมก่อนเคลื่อนย้าย ไม่มี

วันที่ประเมิน..... เวลาที่ประเมิน..... เวลาที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย.....

ลงชื่อผู้ประเมิน/ตรวจสอบ.....RN ลงชื่อบุคคลที่ไปกับผู้ป่วย..... Extern / พชท. 1 / พชท.2 ขึ้นไป

* กรณีดังต่อไปนี้ ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากหน่วยงาน

(1) Drip adrenaline ต้องรายงาน Attending ก่อนตัดสินใจ

(2) ค่า Potassium <2.5 หรือ >5.5

(3) FBS หรือ DTX < 70 mg% (5) pH < 7.2

(4) ผู้ป่วยได้รับ ยากลุ่ม muscle paralysis

(5) pH < 7.2

** กรณีไม่สามารถตัดสินใจได้ในเวลาราชการให้ปรึกษา อาจารย์ Attending นอกเวลาราชการให้ปรึกษาอาจารย์เวร