



แบบสังเกตการปฏิบัติของบุคลากรในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะ

เดือน..... หน่วยงาน.....

- คำชี้แจง :
1. ติดสติ๊กเกอร์ผู้ป่วยลงในช่องมุมบนด้านขวา
 2. ระบุตำแหน่งงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหัตถการนั้น ๆ ลงในช่อง "ตำแหน่งที่ปฏิบัติ"
 3. ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องการ "ปฏิบัติ" หรือ "ไม่ปฏิบัติ" ตามจริงที่ได้จากการสังเกต
 4. ทำเครื่องหมาย ○ ลงในช่องการปฏิบัติ หากไม่มีหัตถการ
 5. ทำเครื่องหมาย * หากผู้ป่วยมีข้อจำกัด พร้อมระบุรายละเอียดของข้อจำกัดนั้นลงในหมายเหตุท้ายตาราง

CAUTI

ติดสติ๊กเกอร์ผู้ป่วย

ว/ด/ป ที่สังเกต	หัวข้อ CAUTI Bundle	ตำแหน่งงานของ บุคลากรที่ปฏิบัติ	การปฏิบัติ	
			ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
C: Catether indication				
	C1. มีการอุดกั้นท่อปัสสาวะ			
	C2. ประเมินการไหลเวียนเลือดโดยการบันทึกปัสสาวะ			
	C3. ผู้ป่วยผ่าตัด			
	1) ระยะเวลานาน			
	2) ผ่าตัดกันกับ			
	3) ผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ			
	C4. มีแผลบริเวณก้นกบและอวัยวะเพศ			
	C5. จำกัดการเคลื่อนไหวเวลานอน			
	C6. ความสุขสบายของผู้ป่วยระยะสุดท้าย			
A: Aseptic technique				
	A1. บุคลากรต้องผ่านการอบรม			
	A2. เตรียมอุปกรณ์ครบถ้วน			
	A3. ล้างมือก่อนใส่สายสวน			
	A4. ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยสบู่และน้ำ เช็ดให้แห้ง			
	A5. เช็ดรูเปิดท่อปัสสาวะด้วยน้ำปราศจากเชื้อ/ hibitane 1:100/0.9% NSS			
	A6. ใส่สายสวนปัสสาวะด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ			
	A7. ตรึงสายสวนให้แน่น หลุม: โคนขาด้านใน ชาย: โคนขาด้านหน้าหรือหน้าท้อง			
	A8. เก็บปัสสาวะส่งตรวจด้วยเทคนิคปลอดเชื้อโดย			
	1) หนีบสายสวนปัสสาวะทิ้งไว้ 15 นาที			
	2) ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดปลายสายสวนปัสสาวะทางสายที่ต่อลงถุงปัสสาวะ			
	3) ใช้ syringe 10 ml ต่อเข็มเบอร์ 24 ดูดน้ำปัสสาวะตำแหน่งที่เช็ดแอลกอฮอล์			
U: Urinary catheter care				
	U1. ดูแลการใส่สายสวนปัสสาวะให้เป็นระบบปิด			
	U2. จัดสายสวนปัสสาวะให้ลาดลงต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะ			
	U3. ปรับสายสวนปัสสาวะให้ปัสสาวะไหลลงถุงสะดวกไม่ให้เป็นท้องช้าง			
	U4. ให้หนีบสายสวนปัสสาวะ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย			
	U5. ดูแลสายสวนปัสสาวะไม่ให้หัก พับ งอ หรืออุดตัน			
	U6. ถุงรองรับปัสสาวะห้ามสัมผัสพื้น			
	U7. เทปัสสาวะให้ใช้ สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดปลายท่อก่อนและหลังเทปัสสาวะ ไม่ให้ท่อเปิดสัมผัสภาชนะรองรับปัสสาวะ			
	U8. เปลี่ยนสายสวนและถุงรองรับปัสสาวะเมื่อชำรุด รั่ว อุดตันหรือเมื่อเกิดการติดเชื้อ			
	U9. ทำความสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน			
	U10. ทำความสะอาดหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง			
T: Time to clean hand 5 Moments				
	T1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย			
	T2. ก่อนทำหัตถการ			
	T3. หลังทำหัตถการ/สัมผัสสารคัดหลั่ง			
	T4. หลังสัมผัสผู้ป่วย			
	T5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย			
I: Indication Checked & Remove				
	I1. การตรวจสอบการใส่สายสวนตามข้อบ่งชี้ หากไม่มีข้อบ่งชี้ ให้ถอดสายสวนออกทันที			

*หมายเหตุ :

หมายเหตุ ข้อบ่งชี้การล้างมือตามหลัก 5 moments คือ

1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
2. ก่อนการทำหัตถการ
3. หลังการทำหัตถการ
4. หลังสัมผัสสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย และ
5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย

ลงชื่อ.....ผู้สังเกต

ตำแหน่ง ICWN/RN/PN