



แบบบันทึกการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัด (3P SSI Bundle Care)

หน่วยงาน..... ที่นำคลินิก ☐Surg ☐Ortho ☐Obs-Gyne ☐EYE ☐ENT ☐Other

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่มีการปฏิบัติเท่านั้น

ระยะก่อนผ่าตัด (Pre-operation)

- | | |
|---|--|
| ☐ กรณี Elective มีการค้นหาและรักษาการติดเชื้อทุกอย่างที่เกิดขึ้น | ☐ ไม่กำจัดขน ยกเว้นขนบริเวณที่รบกวนการผ่าตัด |
| ☐ ให้ Prophylactic antibiotic เฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้ | ☐ ให้ Prophylactic antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมงก่อนลงมีด |
| ☐ ให้ผู้ป่วยฟอกตัว/อาบน้ำโดยใช้ 2-4% Chlohexidine เข้าวันผ่าตัด | ☐ มีการใช้ แบบตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ป่วยทำผ่าตัด/หัตถการ |
| ☐ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้น้อยกว่า 110-150 มก/ดล. | ☐ การใช้ 2% mupirocin ointment ป้ายจมูก ก่อนผ่าตัด (วันละ 2 ครั้ง 5 วัน ก่อนผ่าตัด และ 1 ครั้ง เข้าวันผ่าตัด : เฉพาะ การผ่าตัดชนิด Clean wound) |

Note :

.....

ลงชื่อผู้บันทึก.....

ระยะผ่าตัด (Peri-operation)

- | | |
|---|--|
| ☐ ทำความสะอาดมือโดยใช้น้ำและน้ำยาฆ่าเชื้อ/แอลกอฮอล์ | ☐ ห้องผ่าตัดอุณหภูมิ 18-24 องศาเซลเซียส |
| ☐ เตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัดด้วยน้ำยาทำลายเชื้อ | ☐ สวมเครื่องป้องกันร่างกายถูกต้อง |
| ☐ ดูแลไม่ให้อุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยต่ำ (Keep>36 องศา) | ☐ ปิดประตูห้องผ่าตัดตลอดเวลา |
| ☐ ห้องผ่าตัดเป็น Positive Room | ☐ ห้องผ่าตัด ความชื้นไม่เกิน 30-60 องศาเซลเซียส |

Note :

.....

ลงชื่อผู้บันทึก.....

ระยะหลังผ่าตัด (Post-operation)

- | | |
|---|--|
| ☐ หยุดการให้ Antibiotic หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง | ☐ ควรเอาท่อระบายออกทันทีเมื่อไม่มีความจำเป็น |
| ☐ ไม่เปิดแผลผ่าตัดก่อน 24-48 ชั่วโมง ยกเว้นแผลมี Discharge ชิม | ☐ ล้างมือแบบ Hygienic hand washing ก่อนและหลังทำแผลผ่าตัด |
| ☐ ทำแผลสะอาดก่อนแผลที่มีการติดเชื้อ | ☐ ทำแผลโดยใช้หลัก Aseptic technique |
| ☐ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้น้อยกว่า 110-150 มก/ดล. | |

Note :

.....

สติกเกอร์ผู้ป่วย

ลงชื่อผู้บันทึก.....