



แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหลังจำหน่าย (Post Discharge Surveillance)

ติดสติ๊กเกอร์ผู้ป่วย

Dx.....

Operation.....

ตำแหน่งของแผลผ่าตัด.....

วันที่ผ่าตัด...../...../.....ระยะเวลาผ่าตัด.....นาที่

พบผู้ป่วย หลังผ่าตัด.....วัน

แพทย์เจ้าของไข้.....

CLT => Surg Ortho Eye ENT Obs-Gyn Other

สภาวะสุขภาพผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (ASA Score)

- () ระดับ 1 (ASA Class 1) () ระดับ 2 (ASA Class 2) () ระดับ 3 (ASA Class 3)
 () ระดับ 4 (ASA Class 4) () ระดับ 5 (ASA Class 5)

ชนิดการผ่าตัด

- () Clean Wound () Clean-Contaminated Wound
 () Contaminated Wound () Dirty Wound

ลักษณะของแผลผ่าตัดและอาการแสดงที่พบ

- () แผลดี ไม่มีอาการผิดปกติ () บริเวณแผลผ่าตัดแดงและร้อน
 () มีหนองตรงตำแหน่งที่ผ่าตัด () ผู้ป่วยมีไข้ >38 องศาเซลเซียส
 () แผลผ่าตัดมีรอยแยก () แพทย์เปิดแผล เนื่องจากแพทย์วินิจฉัยว่า มีการติดเชื้อ
 () บริเวณแผลผ่าตัดบวม () ผลการตรวจพบเชื้อ.....
 () บริเวณแผลผ่าตัดกดเจ็บ () อื่นๆ

ลงชื่อ.....

แพทย์ผู้ประเมิน

วันที่...../...../.....

สำหรับ ICN

| SSI Risk Index | Score = 0 | Score = 1 |
|---|------------------------|------------------|
| ASA Score | 1 หรือ 2 | 3, 4 หรือ 5 |
| Wound Class | Clean หรือ Clean-Cont. | Cont. หรือ Dirty |
| Duration of Operation | <75 percentile | >75 percentile |
| SSI Risk Index Score = คะแนน <input type="checkbox"/> ไม่มีความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง | | |

หมายเหตุ : การจำแนกผู้ป่วย (หน้าถัดไป)

การจำแนกผู้ป่วยออกเป็นระดับต่างๆตาม สภาพผู้ป่วยปัญหาและโรคที่เป็นอยู่ด้วย
ASA (American association of Anesthesiologist)

- ASA Class 1 - ผู้ป่วยสุขภาพดี - ไม่อ้วน BMI <30, ไม่สูบบุหรี่
- ASA Class 2 - ผู้ป่วยที่มีโรคเล็กน้อย >>ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมอาการได้ดี ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ , ต่อมแอดลกอฮอล์บ่อยครั้ง ตั้งครรภ์ อ้วน < BMI 35 มีพยาธิสภาพที่ปอดเล็กน้อยโดยไม่ส่งผลต่อสุขภาพ
- ASA Class 3 - ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น มีผลการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ ผู้ป่วยไตวายที่ต้องฟอกเลือด - อ้วน ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมอาการได้ไม่ดี ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง - พิษสุราเรื้อรัง ร่วมกับมีตับอักเสบ - มีประวัติ angina pectoris (เจ็บแน่นนอกจากโรคหัวใจ, MI, CVA หรือ congestive heart failure ที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้าย มากกว่า 3 เดือน ก่อนผ่าตัด - มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ
- ASA Class 4 - ผู้ป่วยที่มีโรคซึ่งรุนแรงมาก ต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ระบบหายใจล้มเหลวที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ - มี severe systemic disease ที่ทำให้ต้องจำกัด Activity และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้ - ประวัติ unstable angina pectoris , MI หรือ CVA ที่เกิดภายใน 3 เดือนก่อนผ่าตัด - Severe Congestive Heart failure - Un control DM หรือ Hypertension หรือ Epilepsy หรือ COPD
- ASA Class 5 ผู้ป่วย Coma หรือมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะได้เข้ารับการผ่าตัดหรือไม่ก็ตาม เช่น Ruptured AAA ,Massive trauma, extensive intracranial hemorrhage with mass effect.
- ASA Class 6 Case ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะสมองตายและลงความเห็นว่าเป็นเสียชีวิตแล้ว มาเข้ารับการผ่าตัด เพื่อบริจาคอวัยวะ