

การเก็บรักษาและความคงตัวของยาที่ใช้ในห้องวิสัญญี  
(Update ก.พ. 64)

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อทางการค้า	อุณหภูมิเก็บยา ก่อนเปิดใช้ <sup>1</sup>	การเก็บ ป้องกัน แสง	อุณหภูมิเก็บ ยาหลังเปิดใช้	ความคงตัว หลังเปิดใช้	สารละลายที่เข้ากันได้	หมายเหตุ
1.	Atracurium besylate	Notrixum® 10 mg/1 mL, 5 mL	2 - 8 °C (ห้ามแช่แข็ง) <sup>1</sup>	-	<30 °C	14 วัน <sup>1</sup>	D5W, NSS, D5S : Conc 0.2 หรือ 0.5 mg/mL ควรใช้ใน 24 ชม. <sup>1</sup>	หลังเปิดให้ใช้ยาใน 14 วัน ถึงแม้จะเก็บ เข้าตู้เย็นอีกครั้งก็ตาม <sup>1</sup>
2.	Bupivacaine HCl	Marcaine 0.5%, 10 mL, 20 mL (POLYAMP 5 mg/mL)	< 30 °C	-	เก็บไม่ได้	เก็บไม่ได้		ยามีปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด จึงไม่ควร สัมผัสกับพื้นผิวโลหะเป็นเวลานาน <sup>1</sup>
3.		Marcaine spinal 0.5%, 4 mL (ISOBARIC)	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	-	เก็บไม่ได้	เก็บไม่ได้	ไม่แนะนำให้ผสมยาใดๆกับ สารละลายเพื่อการให้ยาเข้าช่อง ไขสันหลัง <sup>1</sup>	ภายหลังจากเปิดหลอดแล้วต้องให้ยาให้ เร็วที่สุด <sup>1</sup>
4.	Bupivacaine HCl in Dextrose inj.	Bupitroy heavy® 5 mg/mL inj, 4 mL	< 30 °C	-	เก็บไม่ได้	เก็บไม่ได้		
5.	Cisatracurium besylate	Cisatracurium KABI® 2 mg/mL inj., 5 mL amp.	2 - 8 °C (ห้ามแช่แข็ง) <sup>1</sup>	ป้องกันแสง <sup>1</sup>	2 - 8 °C	21 วัน <sup>2</sup>	D5W, NSS, D5S : Conc 0.1 mg/mL คงตัว 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้องและในตู้เย็น <sup>2</sup>	
6.	Desflurane 100 %	Suprane®	< 30 °C	-	-	-		เก็บขวดในแนวตั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหล ปิดฝาขวดให้สนิทแต่ไม่แน่นเกินไป <sup>1</sup>
7.	Ketamine	Ketamine 50 mg/mL; 10 mL	< 25 °C <sup>2</sup>	ป้องกันแสง <sup>2</sup>	< 25 °C	28 วัน	NSS, D5W คงตัว 24 ชั่วโมง ที่ 25°C <sup>3</sup>	
8.	Propofol	Fresofol® MCT/LCT 1%, 20 mL	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	-	< 25 °C	6 ชั่วโมง <sup>1</sup>	D5W, NSS ความเข้มข้นอย่าง น้อย 2 mg/mL <sup>1</sup>	เจือจางแล้วควรใช้ภายใน 6 ชม. <sup>1</sup>
9.	Sevoflurane	Sevorane® quickfill 250 mL	< 30 °C	-	< 30 °C			เก็บได้ถึงวันหมดอายุที่ระบุในฉลาก <sup>1</sup>
10.	Suxamethonium Cl	Succinylcholine 500 mg/10 mL	2 - 8 °C	-	2 - 8 °C , < 25 °C	24 ชั่วโมง <sup>3</sup>	NSS : Conc. 1 หรือ 2 mg/mL <sup>3</sup>	
11.	Rocuronium Br	Esmeron® 50 mg/5 mL	2 - 8 °C (ห้ามแช่แข็ง) <sup>3</sup>	-	< 25 °C	24 ชั่วโมง <sup>2</sup>	D5W, D5S, LR, NSS <sup>3</sup>	ควรเจือจางให้ได้ 5 mg/mL

เอกสารอ้างอิง

1. เอกสารกำกับยา
2. Micromedex Drugs Solution
3. Drug on injectable drug handbook 16<sup>th</sup> edition