

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Dupilumab
ข้อบ่งชี้สำหรับรักษาโรคที่ดีขั้นรุนแรง ชนิดอีโซสิโนฟิลสูง (severe eosinophilic asthma) หรือ FeNo \geq 25 ppb
(มีผลบังคับใช้วันที่ 2 พฤษภาคม 2567)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

- | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|
| 1. ชื่อ | สกุล | 2. เพศ <input checked="" type="radio"/> ชาย <input type="radio"/> หญิง | |
| 3. HN | 4. อายุ ปี | เดือน | |
| 5. ส่วนสูง | 6. เช่นติเมตร | 7. พื้นที่ผิวร่างกาย | ตารางเมตร |
| 8. สิทธิการเบิก <input checked="" type="radio"/> กรมบัญชีกลาง <input type="radio"/> อื่น ๆ | | | |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการขอใช้ยา

เกณฑ์การสั่งใช้ยาจะต้องระบุว่า “ใช่” ครบทุกช่อง	ใช่	ไม่ใช่
ก. กรณีขอใช้ยาครั้งแรก		
วัน/เดือน/ปี ที่ให้ยา / / วัน/เดือน/ปี ที่รีบิจฉัย / /		
1. ผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจและการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ/อายุรศาสตร์ โรคภูมิแพ้ <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>		
2. วินิจฉัยตามเกณฑ์พนฯ เป็นโรคที่ดีขั้นรุนแรง (severe asthma) และ/หรือ มีอาการผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis) ระดับปานกลาง - รุนแรง และ/หรือ มีอาการริดสีดวงจมูก (nasal polyp) เป็นโรคร่วม และควบคุมไม่ได้ด้วย ICS/LABA (uncontrolled ตาม GINA guideline step 5) มาเป็นระยะเวลา ≥ 6 เดือน วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มใช้ ICS/LABA / / ระบุชนิด (ICS/LABA)	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
3. ผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>		
4. มีระดับ blood eosinophil ≥ 150 cells/ μ l และ/หรือ มีผลตรวจ FeNo ≥ 25 ppb ภายใน 3 เดือน ก่อนการพิจารณาใช้ยา วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ / / ระบุค่า blood eosinophil cells/ μ l ระบุค่า FeNo ppb	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
5. ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาการที่ดีได้ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้		
5.1 ตรวจ spirometry พน FEV1 < ร้อยละ 80 ของค่าปกติ ค่า FEV1 ร้อยละ วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ / /	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
5.2 เทบีส์ท่อช่วยหายใจ (intubation) หรือ mechanical ventilatory support	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
5.3 มีอาการกำเริบอย่างรุนแรง (severe exacerbation) โดยต้องได้ systemic corticosteroids เทียนเท่า oral prednisolone ≥ 30 mg ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป หรือ ≥ 2 ครั้ง ต่อปี	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
5.4 มีประวัติการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน (Prednisolone) > 10 mg/วัน ติดต่อกัน > 30 วัน	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
ข. การประเมินผลการรักษา		
<input checked="" type="radio"/> กรณีใช้ยาครั้งแรก ประเมินผลที่ 12 สัปดาห์ (ถ้าผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษา ให้ยาต่อและประเมินผลทุก 24 สัปดาห์) ระบุผลการประเมิน		
<input checked="" type="radio"/> กรณีใช้ยาตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ประเมินผลทุก 24 สัปดาห์ การให้ยาครั้งนี้เป็นครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ที่ให้ยา / / ระบุผลการประเมิน		
ค. กรณีเข้าเกณฑ์การหยุดยา ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้		
<input checked="" type="radio"/> มีอาการที่ดีกำเริบเฉียบพลันอย่างต่อเนื่อง จำนวนที่ดีกำเริบเฉียบพลันไม่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ยา		
<input checked="" type="radio"/> uncontrolled ตาม GINA guideline		
<input checked="" type="radio"/> เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาชนิดรุนแรง		
<input checked="" type="radio"/> อยู่ในระดับ controlled ตาม GINA guideline (ยกเว้น ผลการตรวจสมรรถภาพปอด) ร่วมกับค่า PEF Variability $< 15\%$ ให้ยาต่อจนครบ 1 ปี แล้วให้หยุดยา		

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ แพทย์ผู้สั่งใช้ยา

(.....)

วัน/เดือน/ปี

