

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Omalizumab
ข้อปงเข็มสำหรับรักษาโรคที่ต้นรุนแรง ชนิดภูมิแพ้สูง (severe allergic asthma)
(แก้ไขจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 228 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

1. ชื่อ สกุล 2. เพศ ชาย หญิง
 3. HN 4. อายุ ปี เดือน 5. น้ำหนักตัว กิโลกรัม
 6. ส่วนสูง เซนติเมตร 7. พื้นที่ภิเวร่างกาย ตารางเมตร
 8. สิทธิการเบิก กรมบัญชีกลาง อื่น ๆ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประวัติการขอใช้ยา

เกณฑ์การตั้งใช้ยาจะต้องระบุว่า “ใช่” ครบถ้วน才算

ใช่ ไม่ใช่

ก. กรณีขอใช้ยาครั้งแรก

- วัน/เดือน/ปี ที่ให้ยา / / วัน/เดือน/ปี ที่วินิจฉัย / /
 1. ผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ/อายุรศาสตร์ โรคภูมิแพ้
 2. วินิจฉัยตามเกณฑ์พบว่าเป็นโรคที่ต้นรุนแรง (severe asthma) และควบคุมไม่ได้ด้วย ICS/LABA (uncontrolled ตาม GINA guideline step 5) มาเป็นระยะเวลา ≥ 6 เดือน
 วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มใช้ ICS/LABA / / ระบุชนิด (ICS/LABA)
 ระบุชนิดของ Other controllers (ถ้ามี)
 3. ผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 4. มีการตรวจสารก่อภูมิแพ้ ด้วยการตรวจสอบ skin prick test หรือ specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (aero - allergen) ให้ผลบวก
 5. มีระดับ serum total IgE (อยู่ระหว่าง 30 -1,500 IU/mL) โปรดระบุ IU/mL
 6. ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาการที่ต้องได้ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 6.1 ตรวจ spirometry พบ FEV1 < ร้อยละ 80 ของค่าปกติ
 ค่า FEV1 ร้อยละ วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ / /
 6.2 เคยใส่ท่อช่วยหายใจ (intubation) หรือ mechanical ventilatory support
 6.3 มีอาการกำเริบอย่างรุนแรง (severe exacerbation) โดยต้องได้ systemic corticosteroids เทียบเท่า oral prednisolone ≥ 30 mg ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป หรือ ≥ 2 ครั้ง ต่อปี
 6.4 มีประวัติการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน (Prednisolone) > 10 mg/วัน ติดต่อกัน > 30 วัน

ข. การประเมินผลการรักษา

- กรณีใช้ยาครั้งแรก ประเมินผลที่ 12 สัปดาห์ (ถ้าผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษา ให้ยาต่อและประเมินผลทุก 24 สัปดาห์)
 ระบุผลการประเมิน
 กรณีใช้ยาตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ประเมินผลทุก 24 สัปดาห์
 การให้ยาครั้งนี้เป็นครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ที่ให้ยา / /
 ระบุผลการประเมิน

ค. กรณีเข้าเกณฑ์การหยุดยา ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- มีอาการทึบตันหูทั้งสองข้างต่อเนื่อง จำนวนที่ต้องการใช้ยาเพิ่มพลั่วไม่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ยา
 uncontrolled ตาม GINA guideline
 เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาชนิดอื่นๆ
 อยู่ในระดับ controlled ตาม GINA guideline (ยกเว้น ผลการตรวจสมรรถภาพปอด) ร่วมด้วยค่า PEF variability $< 15\%$ ให้ยาต่อจนครบ 1 ปี แล้วให้หยุดยา

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ แพทย์ผู้สั่งใช้ยา
 (.....)
 วัน/เดือน/ปี

