

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Omalizumab
ข้อบ่งชี้สำหรับรักษาโรคหืดชนิดรุนแรง ชนิดภูมิแพ้สูง (severe allergic asthma)
(มีผลบังคับใช้วันที่ 2 พฤษภาคม 2567)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|
| 1. เพศ | หญิง | เพศ ♂ ชาย <input type="radio"/> หญิง <input checked="" type="radio"/> | |
| 3. HN | 4. อายุ | ปี | เดือน |
| 6. ส่านสูง | 7. พื้นที่ผิวร่างกาย | เดือน | ตารางเมตร |
| 8. สิทธิการเบิก <input type="radio"/> กรมบัญชีกลาง <input checked="" type="radio"/> อื่นๆ | | | |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการขอใช้ยา

เกณฑ์การสั่งใช้ยาจะต้องระบุว่า "ใช่" ครบทุกข้อ	ใช่ <input type="radio"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
ก. กรณีขอใช้ยาครั้งแรก		
วัน/เดือน/ปี ที่ให้ยา/...../..... วัน/เดือน/ปี ที่วินิจฉัย/...../.....		
1. ผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ/อายุรศาสตร์ โรคภูมิแพ้	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. วินิจฉัยตามเกณฑ์พบร่วมเป็นโรคหืดขั้นรุนแรง (severe asthma) และควบคุมไม่ได้ด้วย ICS/LABA (uncontrolled) ตาม GINA guideline step 5) มาเป็นระยะเวลา ≥ 6 เดือน วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มใช้ ICS/LABA/...../..... ระบุชนิด (ICS/LABA) ระบุชนิดของ Other controllers (ถ้ามี)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. ผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4. มีการตรวจสารก่อภูมิแพ้ ด้วยการตรวจสอบ skin prick test หรือ specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (aero - allergen) ให้ผลบวก	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5. มีระดับ serum total IgE (อยู่ระหว่าง 30 -1,500 IU/mL) โปรดระบุ IU/mL	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6. ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาการหืดได้ <u>ตามข้อใดข้อหนึ่ง</u> ดังต่อไปนี้		
6.1 ตรวจ spirometry พบ FEV1 < ร้อยละ 80 ของค่าปกติ ค่า FEV1 ร้อยละ วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ/...../.....	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6.2 เดย์ไซส์อ่อนหายใจ (intubation) หรือ mechanical ventilatory support	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6.3 มีอาการกำเริบอย่างรุนแรง (severe exacerbation) โดยต้องได้ systemic corticosteroids เทียบเท่า oral prednisolone ≥ 30 mg ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป หรือ ≥ 2 ครั้ง ต่อปี	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6.4 มีประวัติการใช้ยาเดียรอยด์ชนิดรับประทาน (Prednisolone) > 10 mg/วัน ติดต่อกัน > 30 วัน	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ก. การประยุกต์การรักษา		
<input checked="" type="radio"/> กรณีใช้ยาครั้งแรก ประมิณผลที่ 12 สัปดาห์ (ถ้าผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษา ให้ยาต่อและประมิณผลทุก 24 สัปดาห์) ระบุผลการประมิณ		
<input checked="" type="radio"/> กรณีใช้ยาตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ประมิณผลทุก 24 สัปดาห์ การให้ยาครั้งนี้เป็นครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ที่ให้ยา/...../..... ระบุผลการประมิณ		
ก. กรณีเข้าเกณฑ์การหยุดยา <u>ตามข้อใดข้อหนึ่ง</u> ดังต่อไปนี้		
<input checked="" type="radio"/> มีอาการหืดกำเริบเฉียบพลันอย่างต่อเนื่อง จำนวนหืดกำเริบเฉียบพลันไม่ลดลงเมื่อปรับเปลี่ยนที่นอนกันก่อนใช้ยา		
<input checked="" type="radio"/> uncontrolled ตาม GINA guideline		
<input checked="" type="radio"/> เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาชนิดรุนแรง		
<input checked="" type="radio"/> อยู่ในระดับ controlled ตาม GINA guideline (ยกเว้น ผลการตรวจสมรรถภาพปอด) ร่วมกับค่า PEF variability < 15% ให้ยาต่อจนครบ 1 ปี แล้วให้หยุดยา		

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ แพทย์ผู้สั่งใช้ยา

(.....).

วัน/เดือน/ปี

