

มองรอบด้านค้นหาความเสี่ยง 2P Safety
 บัญชีความเสี่ยง Clinical Common Risk (Patient Safety)
 หน่วยงาน.....หอผู้ป่วยสามัญตลยกรรมทั่วไป 12/2.....

SIMPLE	ประเด็นความเสี่ยง	แยกแยะ	ผลกระทบ	ระดับความ
		(ความถี่/ 1	2	เสี่ยง (1 x 2)
S : Safe Surgery	S1 : Safe Surgery and Invasive Procedure			
	1.การเตรียมผู้ป่วยไปห้องผ่าตัดผิดพลาด	1	2	2
	2.โกนขนก่อนผ่าตัดแล้วเกิดแผล	1	2	2
	3.ลืมให้ยา Antibiotic ก่อนเข้าห้องผ่าตัด	1	2	2
	4.ลืมงดน้ำและอาหารก่อนผ่าตัด	1	2	2
	5.ไม่ได้เตรียมเลือดให้พร้อมก่อนเข้าห้องผ่าตัด	1	2	2
	6.การเกิดภาวะ Venous Thromboembolism (VTE)หลังผ่าตัด	2	5	10
	7.ไม่ได้งดยาละลายลิ่มเลือดก่อนการผ่าตัด	1	3	3
	S2 : Safe Anesthesia			
	1.สาย Epidural cath เลื่อนหลุด	1	3	3
S3 : Safe Operating Theater				
I : Infection Prevention and Control	I1 : Hand Hygiene			
	1.ไม่ล้างมือ/ล้างไม่เหมาะสมก่อน-หลังทำกิจกรรมกับผู้ป่วย	3	1	3
	I2 : Prevention of Healthcare Associated Infection			
	1.การติดเชื้อ CAUTI	1	3	3
	2.การติดเชื้อ CABS I	2	3	6
	3.การติดเชื้อดื้อยา CRE , MDR	1	3	3
	4.การติดเชื้อแผลผ่าตัด	2	3	6
	I3 : Isolation precautions			
	1.การแพร่กระจายเชื้อดื้อยา CRE , MDR	1	3	3
	2.ห้องแยกมีไม่เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	1	3	3
I4 : Prevention and Control Spread of Multidrug-Resistant Organisms (MDRO)				
M : & Medication Blood Safety	M1 : Safe from Adverse Drug Events (ADE)			
	1.แพ้ยา	1	4	4
	2.ให้ยาตัวที่ผู้ป่วยแพ้	1	4	4
	3.ผู้ป่วยได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาที่มีความเข้มข้นสูง เช่น phlebitis	2	2	4
	4.ผู้ป่วยได้รับยา High Alert Drug เกินขนาด (ไม่ได้ปฏิบัติตาม Guideline)	1	4	4
M2 : Safe from Medication Error				
1.Dispensing error	2	2	4	
2.Transcribing error	3	2	6	
3.Adminstination error จากการบริหารยาของพยาบาล เช่น ให้ยาผิด dose ชนิด ผิดคน ผิดเวลา	3	2	6	

มองรอบด้านค้นหาความเสี่ยง 2P Safety
บัญชีความเสี่ยง Clinical Common Risk (Patient Safety)
หน่วยงาน.....หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมทั่วไป 12/2.....

SIMPLE	ประเด็นความเสี่ยง	แยกแยะ	ผลกระทบ	ระดับความ
		(ความถี่/ 1	2	เสี่ยง (1 x 2)
	M3 : Medication Reconciliation			
	1.ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาเดิมต่อเนื่องจากการไม่ได้ทำ Medication Reconciliation	3	3	9
	2.ผู้ป่วยได้รับยาซ้ำซ้อนจากการไม่ได้รับการทำ Medication Reconciliation	3	3	9
	M4 : Rational Drug Use (RDU)			
	1.การคำนวณอัตราส่วนผสมยาผิดพลาด	1	4	4
	M5 : Blood Transfusion Safety			
	1.มีปฏิกิริยาจากการได้รับเลือด	1	3	3
	2.การให้เลือดผิดคน	1	4	4
	3.การให้เลือดผิดหมู่	1	4	4
P : Patient Process	P1 : Patients Identification			
	1.ส่ง Specimen/lab / x-ray ติดชื่อผิด	3	2	6
	2. x-ray ผิดข้างผิดตำแหน่ง	1	3	3
	3.การส่งตรวจ lab , x-ray ตรวจพิเศษต่าง ๆ ไม่ ครบตาม order	1	3	3
	P2 : Communication			
	1.การสื่อสารรายงานอาการผู้ป่วยไม่ครอบคลุม และล่าช้า	1	4	4
	2.การส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมพยาบาลและแพทย์ไม่ครบถ้วน	2	2	4
	3.เกิดความล่าช้าและผิดพลาดในการพยาบาล จากการใช้คำสั่งการรักษาเป็นคำย่อที่ไม่	2	2	4
	4.การรายงานผล Lab ล่าช้า	1	3	3
	5.ไม่มีแนวทางในการทำงานค่าผล Lab วิฤต ไปในทิศทางเดียวกัน	1	3	3
	P3 : Reduction of Diagnostic Errors			
	1.ขาดการ Re-assessment , การ Early detection กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงยัง	2	4	8
	2.ผู้ป่วยไม่ได้รับการวางแผนการดูแลตามอาการหรือโรคที่เป็นอย่างครอบคลุม /ไม่	3	2	6
	3.ผู้ป่วยไม่ได้รับการวางแผนการจำหน่ายอย่างครอบคลุม	1	3	3
	P4 : Prevention of Common Complications			
	1.เกิดแผลกดทับ	1	4	4
	2.เกิดการพลัดตกหกล้ม/ตกเตียง	2	4	8
	3.เกิด Phlebitis			
	4.ผู้ป่วยเกิดอาการ Alcohol withdrawal	1	4	4
5.ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการผูกยึด.	1	3	3	
P5: Pain Management				
1.ขาดการ Re-assessment , การ Early detection กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาแก้ปวด	2	3	6	
P6 : Refer and Transfer Safety				
1.ขาดการ Re-assessment ผู้ป่วยก่อนส่งทำหัตถการนอกหน่วยงาน/นอนโรงพยาบาล	1	4	4	

มองรอบด้านค้นหาความเสี่ยง 2P Safety
 บัญชีความเสี่ยง Clinical Common Risk (Patient Safety)
 หน่วยงาน.....หอผู้ป่วยสามัญตลยกรรมทั่วไป 12/2.....

SIMPLE	ประเด็นความเสี่ยง	แยกแยะ	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง
		(ความถี่/ 1		
L : Line, Tube & Catheter and	L1 : Catheter and Tubing Connection, and Flow Control			
	1.การเลื่อนหลุดของท่อระบาย.	2	3	6
	2.ท่อเลื่อนหลุด เกิด re -intubation	1	4	4
	3.Miss -conect , Disconect สายท่อระบายต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนการรักษา	2	3	6
	4.ส่ง Lab ผิดชนิด ไม่ครบ ตามแผนการรักษาของแพทย์	1	3	3
	5.ขาดการ Re-assessment , การ Early detection ในผู้ป่วยที่รับย้ายหรือรับใหม่	1	3	3
	L2 : Right and Appropriate Laboratory Specimens and Testing			
1.การรายงานผล Lab ที่ sensitive เช่น ผล Anti HIV ผิดพลาด	1	3	3	
E : Emergency Response	E1 : Response to the Deteriorating Patient			
	1.Un plan CPR	2	5	10
	2.Un plan intubation	2	5	10
	3.Un plan ICU	2	4	8
	4.ภาวะ Hypovolemic shock ในผู้ป่วย UGIB	1	4	4
	5.การเกิดภาวะ septic shock	2	3	6
	E2 : Medical Emergency			
	1.การเริ่มให้ยา Antibiotic ล่าช้า	1	3	3
	2.อุปกรณ์เครื่องมือ ไม่พร้อมใช้ในภาวะวิกฤต	1	3	3
	E3 : Maternal & Neonatal Morbidity			
E4 : ER Safety				
Other (อื่นๆ)	อื่นๆ ที่ไม่ใช่ SIMPE			
	1.ไม่ได้ส่งข้อมูลให้ทีม เยี่ยมบ้าน	1	2	2
	2.ของมีคมติดไปกับset ส่งแผนกsupply	1	2	2
	3.เครื่องมือ/อุปกรณ์ปลอดภัย /เวชภัณฑ์ หมดอายุ	1	2	2
	4.นัดผู้ป่วยผิดวัน/ผิดคลินิก	1	3	3
	5.การเซ็นยินยอมไม่สมบูรณ์/ไม่ได้เซ็นใบยินยอมเข้ารับการรักษา	1	2	2
	6.เวชระเบียนสูญหาย	1	2	2
	7.ผู้ป่วยหนีกลับบ้าน	1	2	2
	8.เบิกเวชภัณฑ์ผิด	2	2	4
	9.แพทย์ไม่แจ้งผู้ป่วยเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนการผ่าตัด	2	2	4
	10.ห้องน้ำไม่สะอาด	1	2	2
	11.ไม่ได้เอา Heparin lock ออกก่อนกลับบ้าน	1	2	2
	12.ไม่ได้คืนยาเดิมผู้ป่วยตอนกลับบ้าน	1	2	2