



ยารักษาโรคกลากและเกลื้อน



โรคกลาก (Tinea infection)	โรคเกลื้อน (Tinea versicolor)
<p>เกิดจาก การติดเชื้อรา (dermatophyte)</p> <p>อาการ คัน – คันมาก</p> 	<p>เกิดจาก การติดเชื้อรา (<i>Pityrosporum orbiculare</i>, or <i>Malassezia furfur</i>)</p> <p>อาการ คัน—คันมาก</p>
<p>ลักษณะผื่น ผื่นแดง วงกลม มีขอบเขตชัดเจน คล้ายวงแหวนที่ขอบวง แหวน มีสะเก็ดลอก เป็นขุย อาจเป็นที่ส่วนต่างๆทั่วร่างกาย</p>	<p>ลักษณะผื่น ผื่นวงกลมสีขาว มีขอบเขตชัดเจน บางครั้งมีสีออกน้ำตาล อาจเป็นที่ใบหน้า ลำตัว ออก หลัง หรือต้นแขน</p> <p>หมายเหตุ เกลื้อนจะไม่เป็นที่ มือ เท้า ขา เล็บ หรือศีรษะ</p>
 <p>ขึ้นที่ศีรษะ เรียกว่า ชันษะตุ</p>  <p>ขึ้นที่ลำตัว ใบหน้า และเท้า (ฮ่องกงฟุต)</p>	 <p>เกลื้อนที่หลัง</p>  <p>เชื้อรา</p>

ยารักษาโรคกลากและเกลื้อน

<ol style="list-style-type: none"> ยากุ่มเอโซล ได้แก่ ไอทราโคนาโซล, คีโตโคนาโซล ยากุ่มอะลิเอมีน ได้แก่ เทอบินาฟีน ยาอื่นๆ ได้แก่ กริสซิโอฟลวิน, โทลนาฟเทท 	<p>ยากุ่มอะลิเอมีน: เทอบินาฟีน</p> <p>กลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์ ในการสร้างไขมันของผนังเซลล์ มีผลทำให้เซลล์แตก</p> <p>ผลข้างเคียง ท้องเสีย ท้องผูก แน่นท้อง คลื่นไส้ ตับอักเสบ เวียนศีรษะ</p>
<p>ยากุ่มเอโซล: ketoconazole</p> <p>กลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์ในการสร้างไขมันของผนังเซลล์ มีผลหยุดการเจริญของเชื้อรา</p> <p>ผลข้างเคียง แพ้ยา เซลล์ตับถูกทำลาย</p>	<p>ข้อควรระวัง ไม่ควรซื้อยากินเอง แต่ควรไปพบแพทย์</p> <p>เอกสารอ้างอิง</p> <ol style="list-style-type: none"> Katzung Basic & clinical Pharmacology 14 th Ed. 2018 Harvey RA & Karen Whalen Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology 6th Ed 2015
<p>การป้องกันการติดเชื้อรา: รักษาความสะอาด อาบน้ำทุกวัน ไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกอาทิตย์</p>	
<p>เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.อรพิน วงศ์สวัสดิ์กุล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว</p>	