



ข้อควรระวังในการใช้พาราเซตามอล

ข้อบ่งใช้



ขนาดที่ปลอดภัย

✓ รับประทาน ครั้งละไม่เกิน 1 กรัม และ วันละไม่เกิน 4 กรัม (ต่อน้ำหนักตัว 70 กิโลกรัม)



หรือ
ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 ชั่วโมง หรือ
ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง หรือ
ขนาด 325 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง

อาการข้างเคียง

อาจทำให้เป็นพิษต่อตับได้ถ้าใช้ยาเกินขนาด

- ควรดื่มน้ำมากๆ ระหว่างใช้ยาเพราะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นพิษต่อตับมากขึ้น
- คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำอาจต้องลดขนาดยา



ปรึกษาแพทย์

ถ้าอาการปวดไม่ดีขึ้นภายใน 5-7 วัน



หรือใช้ไม่ลดภายใน 3 วัน



ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป



เอกสารอ้างอิง

ที่มาของรูป

https://www.123rf.com/photo_110034800_calf-leg-pain-man-holding-sore-and-painful-muscle-sprain-or-cramp-ache-filled-with-red-pink-bright-p.html

https://www.jing.fm/iclip/u2q8r5y3e6e6t4q8_back-pain-backache-ache-gambar-kartun-sakit-punggung/

<https://pedclerk.bsd.uchicago.edu/page/dysmenorrhea>

<http://clipart-library.com/toothache-cartoon.html>

<https://paleoleap.com/paleo-and-migraines/>

<http://sabedoriadavo.blogspot.com/2016/02/misturas-de-alcool.html>

https://www.shutterstock.com/th/search/alcohol+body?search_source=base_related_searches&page=2§ion=1

<https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-cartoon-calendar-vector-illustration-image26669388>

https://www.123rf.com/photo_35771041_stock-vector-illustration-is-a-sick-child-in-bed-with-symptoms-of-fever-and-thermometer-in-his-mouth.html

<https://ui-ex.com/explore/consulted-clipart-doctor-patient/>