

♀ ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน



เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.ยามาระตี จัยสิน
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว




กินแล้วใครว่าไม่ท้อง
แค่ช่วยลดโอกาสในการท้องเท่านั้น
ป้องกันการท้องได้ 75-85%

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
มีตัวยา “ลีโวเนอร์เจสเตรล”
ขนาดเม็ดละ 750 ไมโครกรัม

ข้อเท็จจริงที่ควรรู้

- ไม่สามารถใช้ทำแท้งได้
- ไม่ควรกินเกิน 4 เม็ดต่อเดือน
- ทารกไม่พิการจากยาคุมฉุกเฉิน
- ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การออกฤทธิ์



- ยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนของผู้หญิง
- ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นและยากต่อการฝังตัวของไข่
- มูกบริเวณปากมดลูกเหนียวข้น ทำให้ตัวอสุจิเข้าไปผสมกับไข่ได้ยาก

การกินยา

เม็ดที่ 1

กินทันที หลังจากมี
เพศสัมพันธ์ หรือ
ไม่ควรเกิน 72 ชม.




เม็ดที่ 2

กินไม่เกิน 12 ชม.
หลังจากกินเม็ดแรก

ผลข้างเคียง



มีเลือดออก
กระปริดกระปอย



รังไข่และเยื่อบุโพรงมดลูกผิดปกติและ
เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก
(หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน)



ปวดท้อง



ประจำเดือนมาเร็ว
หรือช้ากว่ากำหนด

การใช้ยา ควรใช้แบบชั่วคราวเท่านั้น หากต้องการใช้ในระยะยาว ควรกินยาคุมกำเนิดแบบปกติ

References

- <http://www.wikihow.com/Track-Your-Menstrual-Cycle>
- <http://cartoonsmix.com/cartoons/girl-stomach-ache-cartoon.html>
- <http://www.lone-parenting.org/ectopic-pregnancy/>
- <http://www.women-info.com/en/brown-discharge-morning-pills/>
- <http://cartoonsmix.com/cartoons/sperm-cartoon.html>
- <https://www.pinterest.com/explore/cartoon-girls/>
- <http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/population-groups/womens-health-portal/menstruation/key-facts>